



Grandes
Cultures

vertissements® agricoles uvergne

Bulletin technique N° 6 du 28/06/94
Supplément n° 2

MAIS

Pyrale : Intervenir entre le 03/7 et le 13/7.

BLE

Maladies : Piétin-échaudage souvent très visible.

MAIS

Stades : 6 à 10 - 11 feuilles.

PYRALE

★ Situation

- En cage d'élevage à MARMILHAT (63) :

- . Début du vol le 13/6
- . Activité croissante depuis.

- Aux piègeages sexuels :

- . Premières captures dès le 13/6 à LUZILLAT (63).
- . Généralisation à tout le réseau depuis le 20/6 (Allier - Puy-de-Dôme et aussi

Cantal).

★ Préconisation

Compte-tenu des conditions climatiques, la période optimale d'intervention "classique" avec les microgranulés se situera entre le 3 et le 13 Juillet. Consulter le dépliant SPV - AGPM (Protection du Maïs) pour le choix de l'insecticide.

A noter que les pyréthrinoïdes liquides employés en fonction du stade du maïs (hauteur de 1 m à 1,20 m) sont déconseillés du fait de favoriser le développement ultérieur de pucerons (Une surveillance s'impose par la suite).



Publication mensuelle
Abonnement annuel : 230 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

P119

OU FAUT-IL TRAITER ?

Les deux cartes jointes vous le précise (ceci à partir des notations réalisées à l'automne dernier).

Il faut remarquer une grande stabilité du problème Pyrale dans l'Allier et le Puy-de-Dôme. A noter seulement une petite extension vers les Combrailles dans le secteur de ST-PARDOUX - MENAT.

BLE


MALADIES

★ Situation

De nombreux symptômes de piétin-échaudage sont visibles depuis 8 - 10 jours particulièrement plus graves en Limagne Nord et sur les 2èmes blés.

★ Préconisation

Aucune intervention chimique ne permet un contrôle de cette maladie.



PYRALE DU MAÏS

Automne 1993

LEGENDE

Population larvaire > 1 larve/pied
TRAITEMENT IMPERATIF


Population larvaire 0,5 à 1 larve/pied
Traitement justifié en maïs semencé
et maïs à haut potentiel (irrigué)

Population larvaire < 0,5 larve/pied
TRAITEMENT INUTILE



P120

PUY-DE-DOME



LEGENDE

Population larvaire > 1 larve/pied
TRAITEMENT IMPERATIF

Population larvaire 0,5 à 1 larve/pied
Traitement justifié en maïs semence
et maïs à haut potentiel (irrigué)

Population larvaire < 0,5 larve/pied
TRAITEMENT INUTILE

PYRALE DU MAÏS

Automne 1993